

Laboratorní výsledky Odebráno: 18.03.2026 09:34:00 Na: 142 mmol/L; K: 4,7 mmol/L; Cl: 104 mmol/L;
Leukocyty: 18,9 $10^9/L$ (4-10); Erytrocyty: 6,13 $10^{12}/L$ (4-5,8); Hemoglobin: 186 g/L (135-175); Hematokrit: 0,552 1(0,4-0,5); MCV: 90 fl ; MCH: 30,3 pg ; MCHC: 337 g/L; RDW: 12,5 %; **Trombocyty: 405 $10^9/L$ (150-400);** MPV: 10,6 fl; PDW: 12,7 fl; Normoblasty abs. počet: 0 $10^9/L$; Neutrofily: 0,548 1;**Eozinofily: 0,238 1(0-0,05);** Bazofily: 0,007 1; **Lymfocyty: 0,151 1 (0,2-0,45);** Monocyty: 0,056 1; Nezralé granulocyty: 0,005 1;**Neutrofily abs. počet: 10,37 $10^9/L$ (2-7); Eozinofily abs. počet: 4,51 $10^9/L$ (0-0,5);** Bazofily abs. počet: 0,13 $10^9/L$; Lymfocyty abs. počet: 2,86 $10^9/L$; Monocyty abs. počet: 1,06 $10^9/L$;**Nezralé granulocyty abs.počet: 0,1 $10^9/L$ (0-0,06);** Komentář: Mikroskopický diferenciál leukocytů doordinován z důvodu morfologického hlášení analyzátoru.; Diferenciál mikroskopicky: (provedeno); Neutrofily: 0,509 1;**Eozinofily: 0,218 1(0-0,05);** Bazofily: 0,009 1; Lymfocyty: 0,2 1; Monocyty: 0,064 1; Popis změn leukocytů: Eozinofilie; Popis změn erytrocytů: beze zmen; Popis změn trombocytů: beze zmen;

Ostatní: Prenewel 2/0,625mg 1-0-0

doplňky na neuropatii : Mieloguard 1-0-0 na 3 měsíce nebo Revitanerv 1-0-0

Glykémie měřit 3x týdně ráno nalačno, zápis do deníčku

Cílová glykémie ráno nalačno 4,5-6,5 mmol/L

Cílová glykémie v průběhu dne do 10 mmol/L

Titrace dlouhého inzulinu (Xultophy) podle posledních 3 lačných glykemií.

Pokud více než polovina hodnot bude vyšší 6,5 mmol/L, navýšit dávku dlouhého inzulinu o 2j.

Pokud více než polovina hodnot bude nižší 4,5 mmol/L, snížit dávku dlouhého inzulinu o 2j.

Titrace je vhodné provádět 1x týdně, nejdříve vždy za 5 dní po změně dávky.

Vydána zpráva.

Kontrola: **za 3 měsíce glyk. + glyk. hgb + přinese zprávu z očního**

- glukometr s sebou - měření 2-3x týdně buď nalačno nebo 2 hodiny po jídle, cíl je glykémie nalačno mezi 4,5-6 mmol/l a 2 hodiny po jídle ideálně do 8,5 (9) mmol/l

- pravidelná monitorace TK, s cílem do 135/85 mmHg

Prosím o časnou kontrolu iontogramu PL (v lab. mírná hyperkalémie - 5,8 mmol/l) a krevního obrazu s diff. (v lab. mírná leukocytóza, erytrocytóza), doporučujeme provedení UZ břicha, kompletizovat onkoscreening, event. dovyšetření hematologem. Děkuji

Poučen, s postupem souhlasí:

Výkony (Ambulantní): 13026

Recepty: VIGANTOL 0,5MG/ML POR GTT SOL 1X10ML 30 kapek 1x tý (1) (eRp) do 16.02., SORTIS 10MG TBL FLM 100 1-0-0 (1) (eRp) do 29.05., XULTOPHY 100U/ML+3,6MG/ML INJ SOL 3X3ML 30 j s.c. v 8.00 hod +- 3 hod (3) (eRp) do 23.07.

Laboratorní výsledky pacienta:

Odebráno: 05.02.2026 07:03

hematologie WBC - leukocyty: 10,85 $10^9/L(4-10)$; RBC - erytrocyty: 6,23 $10^{12}/L(4-5,8)$; HCT - hematokrit: 0,594 L/L(0,4-0,5); MCH - barvivo ery.: 30,2 pg; MPV - stř. obj. trombo.: 10,2 fL; **diabetologie** Glukóza: 6,2 mmol/L(3,9-5,6); Erytrocyty: <4 počet/uL; Cholesterol: 3,7 mmol/L; TSH: 3,29 mU/L; Leukocyty: <3 počet/uL; Triacylglyceroly: 1,3 mmol/L; Bílkovina: negativní; Kreatinin enzymaticky: 111 umol/L(64-104); Cholesterol HDL: 1,07 mmol/L; Kyselina močová: 422 umol/L; Cholesterol LDL: 2,1 mmol/L; CRP: 1 mg/L; Bilirubin: 20,6 umol/L(2-17); Glukóza: 4 a.j.(0-0); AST: 0,33 ukat/L; 25-hydroxyvitamin D: 68,8 nmol/L(75-125); Leukocyty: negativní; ALT: 0,45 ukat/L; Celková bílkovina: 70 g/L; Ketolátky: negativní; ALP: 1,49 ukat/L; Bilirubin: negativní; GGT: 0,3 ukat/L; Urobilinogen: negativní; ACR - poměr Alb/Krea: 2,7 mg/mmol; (A1 Normální až lehce zvýšená) HGB - hemoglobin: 188 g/L(135-175); MCV - stř.obj. ery.: 95,3 fL; MCHC - střední barevná konc.: 316 g/L(320-360); RDW - distr. křivka ery.: 12,9 %; PLT - trombocyty: 380 $10^9/L$; PDW - distr. křivka trombo: 12,2 fL; PCT - hematokrit trombo: 0,39 %(0,12-0,35); Glykovaný hemoglobin (HbA1c): 57 mmol/mol(20-42); pH: 5 1; Nitrity: negativní; Specif. hmotnost: 1,021 kg/L; Krev: negativní; Epitelie dlaždicové: <5 počet/uL; Seznam metod.: Moč chem. a mikrosk., Krevní obraz

Překročen čas preanalytické fáze, výsledky mohou být ovlivněny u výše uvedených metod.; Sodík: 143 mmol/L; Draslík: 5,8 mmol/L(3,8-5); Chloridy: 105 mmol/L; Osmolalita: 300 mmol/kg(285-295); Urea: 8,3 mmol/L; Odhad filtr. CKD-EPI (Krea): 0,92 ml/s/1,73 m²(1-1,5); (Hodnocení CKD dle CKD-EPI: G3a Mírně až středně snižená) FIB-4 skóre: 0,8 1; (Absence významné fibrózy) Cholesterol non-HDL: 2,63 mmol/L; Index aterogenity Klimov: 2,46 1; Kreatinin enzymaticky: 4,3 mmol/L(5,1-14,2); Mikroalbumin: 12 mg/L;